


## Tricomonose

A tricomonose é uma doença sexualmente transmissível causada por *Trichomonas vaginalis*, um parasita extracelular. Pode persistir por longos períodos na mulher, frequentemente associada às vaginoses bacterianas. Cerca de 50% das pessoas infetadas não apresenta sinais ou sintomas.

### Aspecto clínico da infeção

#### Mulher:

- Corrimento vaginal amarelado, espumoso, cheiro fétido
- Dor nas relações sexuais
- Ardor ao urinar
- Prurido



Vaginite por *T. vaginalis* – colo em “framboesa”

Predispõe para **Doença Inflamatória Pélvica**.

#### Homem:

- Maioria assintomática
- Ardor ao urinar e corrimento purulento

- O *T. vaginalis* favorece a transmissão do VIH, tanto pelas lesões que produz, como pela estimulação de reação inflamatória, atraindo para o local infiltração de leucócitos, inclusive Linfócitos T CD4+ e macrófagos (células alvo do HIV).
- Está associado a bebés de baixo peso e nascimentos prematuros em grávidas infetadas.

**Contágio:** sexo desprotegido com pessoa infetada

**Período de incubação:** 5-28 dias.

**Diagnóstico:** Exame microscópico direto ou técnicas de biologia molecular numa amostra de exsudado vaginal (mulheres), uretral ou 1º jacto urinário (homem)

**Tratamento:** Antibiótico (metronidazol)

### IMPORTANTE

- **Deve consultar o seu médico para:**
  - ✓ confirmar o diagnóstico;
  - ✓ ser medicado;
  - ✓ realizar o rastreio das outras IST
- **O uso do preservativo previne a transmissão desta doença**
- **Deve enviar os parceiros sexuais para tratamento e rastreio de IST**